


手术后

- 手术后您需要使用眼药水。请您一定要遵循医生的指示，请在滴眼药水之前洗手，不要让眼药水的瓶口碰到您的眼睛。手术后您的眼睛可能会流泪、感到疼痛、看到眩光和对光线敏感；佩戴太阳眼镜将会帮助您减少这些症状。手术后的一周里最好佩戴眼罩睡觉。



- 术后2周需要避免剧烈举重和剧烈运动。手术后至少一个月不可以游泳。玻璃体切除手术后有出现气泡的患者，除非得到医生允许，否则将无法乘飞机旅行或在高海拔地区旅行。



避免举重



禁止游泳



搭飞机前请
询问医生

清单表格

姓名:

登记号码:

医生:

手术:

估计价格:

押金:

备注:

手术后紧急电话:

病患签名:

如果您在手术后遇到以下任何症状，请与上述的“手术后紧急电话”与我们联系：

- 手术后眼睛疼痛或发红
- 剧烈或突然的疼痛
- 突然失明
- 手术后呕吐或感到恶心
- 手术后眼睛意外受到伤害



联络我们

☎ 03 2730 7666


🌐 oasiseye.my

🌱 linktr.ee/oasiseye



您的眼睛 与您

手术前、后的准备





手术前

- 先确认您将要进行的手术，如有任何疑问请您在手术前询问医生。
- 在确定手术日期后，您将需要缴付押金。
- 如手术当天有任何未偿还的金额都需要在当天全额缴付。
- 在推迟、取消或超额付款的情况下，押金/未使用金额将退还给您。
- 如在绝对必要的情况下，手术期间必需使用到的药物/器材将会添加到帐单中。



手术当天

- 请准时在预约的时间到达。如果您当天无法前来手术，请致电告知诊所。



- 继续服用常规药物，尤其是高血压和糖尿病药物。手术前一周必须在您的医生的批准下才能停止使用血液稀释药物。



- 请在手术前先洗个澡。清洁脸部，尤其是在眼睛和睫毛的周围。



- 请勿使用任何的化妆品或任何的护发产品。



- 如果您在局部麻醉下进行手术，可以在手术前吃一顿便餐。



- 如果您的手术是在全身麻醉下进行(入睡)，则在手术前的6小时您不能进食或饮水。



- 请勿携带任何贵重物品。储物柜可用于存放小物品，例如电话和钱包。



- 手术后您不能开车回家。请确保有人陪同您一起回家。



- 手术中所使用的散瞳滴眼药水将会使您的视力模糊数小时。



- 进入手术室之前，您必须换上特制的手术服。这有助于保持手术室的无菌区防止受到感染。



小贴士

记得保持眼部的清洁。无论是在手术之前还是之后，都可以用蘸有生理盐水的棉绒来清洁眼睑。这将有助于防止您的眼睛在手术后受到感染。